



Chronicité des colonisations

Suite à une erreur de paramétrage de l'exploitation des données saisies dans le registre pour les années antérieures à 2013, les pourcentages d'infections chroniques pour les années 2010, 2011 et 2012 ont été recalculés et figurent ci-dessous.

■ 2010

	Nombre de patients (%)			
	<i>Burkholderia cepacia</i>	<i>Burkholderia gladioli</i>	<i>Inquilinus limosus</i>	<i>Pandoraea spp.</i>
Patients primocolonisés avant 2010	84	10	4	7
<i>Ayant eu au moins 4 ECBC en 2010</i>	51 (60.7 %)	7 (70.0 %)	3 (75.0 %)	7 (100.0 %)
<i>et dont le nombre d'expectorations positives est documenté en 2010</i>	44 (52.4 %)	6 (60.0 %)	1 (25.0 %)	7 (100.0 %)
Patients colonisés chroniques	39 (88.6 %)	5 (83.3 %)	0 (0.0 %)	6 (85.7 %)

■ 2011

	Nombre de patients (%)			
	<i>Burkholderia cepacia</i>	<i>Burkholderia gladioli</i>	<i>Inquilinus limosus</i>	<i>Pandoraea spp.</i>
Patients primocolonisés avant 2011	90	12	7	4
<i>Ayant eu au moins 4 ECBC en 2011</i>	55 (61.1 %)	7 (58.3 %)	4 (57.1 %)	4 (100.0 %)
<i>et dont le nombre d'expectorations positives est documenté en 2011</i>	45 (50.0 %)	6 (50.0 %)	2 (28.6 %)	4 (100.0 %)
Patients colonisés chroniques	40 (88.9 %)	5 (83.3 %)	2 (100.0 %)	4 (100.0 %)

■ 2012

	Nombre de patients (%)			
	<i>Burkholderia cepacia</i>	<i>Burkholderia gladioli</i>	<i>Inquilinus limosus</i>	<i>Pandoraea spp.</i>
Patients primocolonisés avant 2012	90	12	7	8
<i>Ayant eu au moins 4 ECBC en 2012</i>	58 (64.4 %)	10 (83.3 %)	5 (71.4 %)	5 (55.6 %)
<i>et dont le nombre d'expectorations positives est documenté en 2012</i>	57 (63.3 %)	9 (75.0 %)	5 (71.4 %)	5 (55.6 %)
Patients colonisés chroniques	48 (84.2 %)	9 (100.0 %)	3 (60.0 %)	4 (80.0 %)